



ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਪਾਓ

ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਫਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹਿਆਂ :
ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜੋ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਲੇ, ਨਰਮਾ, ਬਰਸੀਮ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ
★ ਕਾਫੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿਓ।

★ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੇ 3 ਛਿੜਕਾਅ ਫੁਲ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਕਰੋ। 60

ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਕੋਰਾਜਨ 18.5 ਐਸ ਸੀ (ਕਲੋਰਾਐਂਟਰਾਨੀਲੀਪਰੋਲ) ਜਾਂ 30 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਫੋਮ 480 ਐਸ ਐਲ (ਫਲੂਬੈਂਡੀਆਮਾਈਡ) ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5



ਐਸ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

★ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਤੋੜ ਲਵੋ।

★ ਕੋਰਾਜਨ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫੋਮ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੋਪਾ : ਇਹ ਕੀੜਾ ਪੌੜਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਕੁਰੁੰਬਲਾਂ ਮੁਰਝਾਅ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ

ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਪੇ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਚੋਪੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ : ਇਹ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੌੜਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਸ ਚੂਸਣ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ (ਪੌਤਾ ਮਰੋੜ ਵਿਸ਼ਾਣੂ) ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ : ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 400 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਮੈਲਾਥਿਆਨ 50 ਈ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਘੋਲ ਕੇ ਫਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੜਕੋ।

ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਥਾਇਲ : 81460-39400

ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 1983 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ

ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਸੰਪੂਰਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ **52 ਅੰਕ**

ਹਰ ਹਫਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ : 90410-14575, 98151-04575

ਚੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੂਟ

ਇੱਕ ਸਾਲ **400** ਰੁਪਏ

ਦੋ ਸਾਲ **700** ਰੁਪਏ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ **1000** ਰੁਪਏ



ਚੰਦੇ ਭਰਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਗਿਫਟ ਡਾਇਰੀ+ਬੈਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ?

ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਧਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ-ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।



ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਨਾ ਹੀ ਲਾਭਵੰਦ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਲਾਗਤ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ 1200 ਘੰਟੇ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ

ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।



ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ

ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਬੜੇ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਞੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਟੇਦਾਰਾਂ

ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨੂ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ



ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ)।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਰਨਕੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਮਤੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ 'ਤੇ

ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਮਦਾਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਰਕਬਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ

ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਆਰ. ਆਈ. ਏ. ਆਈ. ਆਈ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੰਡੋਇਆ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਅਪਨਾਓ

ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਵਰਤਣਾ ਇਕ ਵਾਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ



ਵਧਾਉਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਕਿਰਿਆ

ਗੰਡੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨਿਕ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੱਤੇ, ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ, ਨਿਮਾਟੋਡ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉੱਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ

ਸੜਨ ਗਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਕਿਰਿਆ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਡੋਏ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਵਰਮੀ-ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਦਾ ਅਤੇ ਗੰਡੋਏ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈੱਡ ਵਿਚ 2-3 ਇੰਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਛਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢੇਰ ਵਿਚ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਪਰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਫੱਟ ਗੋਹਾ ਪਾਓ। ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਡੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4-5 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਹਾ ਟੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੋ ਗੰਡੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈੱਡ (ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਡੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈੱਡ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਬਣਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਖਾਦ ਨੂੰ ਗੰਡੋਇਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ

ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਇਕਸਾਰ, ਦਾਣੇਦਾਰ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੰਡੋਇਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈੱਡ ਵਿਚ ਨਮੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਡੋਏ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਅਲਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਸਟ ਨੂੰ 9 ਅਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਛਾਲਣੀ ਨਾਲ ਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਵ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਡੋਏ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਕੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਵਿਰੋਜਪੁਰ (ਮੋ. 99149-25319)

ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੋਪਲ ਦੇ ਨਾਲ

ਕਲੋਡੀਕੋਪ,ਸਪਿੱਕ ਅਤੇ ਮੇਟਕੋਪ, ਨਦੀਨਾਂ ਤੇ ਫੁਲਸਟੋਪ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੂਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੈਚਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਹੈਚਿੰਗ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੇਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੇ ਵਿਚ ਭਰਨਾ : ਵਿਚ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ 'ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈਚਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇ ਸੈਟਰ ਟਰੇਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਹੈਚਿੰਗ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ / ਧੁੰਦ ਕਰਨਾ : ਟਰੇਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ 3x ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਫੋਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਵਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 97.5 ਤੋਂ 99.5% ਜੀਵਾਣੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ : ਜੇਕਰ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੈਟਰ ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਰ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ 75% ਨਮੀ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣਾ : ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ

ਅੰਡੇ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ : ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਅੰਡੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ 'ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰ ਵਿਚ ਆਲ-ਇਨ ਆਲ-ਆਊਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ : ਜਦੋਂ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਚਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗੱਡੇ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ "ਤਾਕਤਵਰ" ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ : ਚੂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਭੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸਿੰਗ ਕਰਨਾ : ਲੇਅਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੂਚਿਆਂ

ਦੇ ਅੰਡੇ ਲਈ) ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਕਲੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ : ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੂਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 95% ਸੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਚਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨਾ : ਜਦੋਂ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਚਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗੱਡੇ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ "ਤਾਕਤਵਰ" ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ : ਚੂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਭੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸਿੰਗ ਕਰਨਾ : ਲੇਅਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੂਚਿਆਂ

ਟੀਕਾਕਰਨ : ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਚਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਰੇਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚੂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਕਟੇਲੀਅਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੂਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ : ਚੂਚੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ : ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੈਚਰੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਕਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਗੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਗੈਰ-ਹੋਚ ਅੰਡੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਚੇ ਹੈਚਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ



ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਸੈਟਰ ਤੋਂ ਹੈਚਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (19ਵੇਂ ਦਿਨ (ਮੁਰਗੀ

ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚੂਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇੱਟ ਸੈਕਸਿੰਗ ਜਾਂ ਆਟੋ-ਸੈਕਸਿੰਗ (ਫੈਦਰ ਸੈਕਸਿੰਗ) ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਪਰਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਰੋਪੜ ਮੋਬਾਇਲ : 99882-27872

ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਡੋਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ ਜਾਂ ਯੂਰੀਮਿਨ ਲਿਕ) ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 95% ਸੁੱਕਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 33% ਪਚਣਯੋਗ ਕੱਚੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ 42-45% ਕੁੱਲ ਪਚਣਯੋਗ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ/ਯੂਰੀਮਿਨ ਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੀਗਾ, 30 ਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਆਰ ਗੁੰਦ ਕੜਾਈ ਵਿਚ ਰਲਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ, 450 ਗ੍ਰਾਮ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ, 120 ਗ੍ਰਾਮ ਲੂਣ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਰਹਿਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖੱਲ ਅਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਰਹਿਤ ਚੌਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 120 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ



ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਓ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਢੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਫਾਢੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।



ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਟ ਸਕੇ। ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਲਾਭ : ★ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ★ ਪਸ਼ੂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੱਭਣ

★ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਾਚਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਢੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਫਾਢੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

★ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦੋ ਸੂਦੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : ★ ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

★ ਪਸ਼ੂ ਚਾਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

★ ਇਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰੂਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕੱਟੜੂ-ਵੱਛੜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਟ ਨਾ ਖੁਆਓ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤੋ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਫਾਰਮ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਮੋ. 98148-25584)

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਿੰਬੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਹੀ ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਆਰੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫਿੜਕਾਅ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫਿੜਕਾਅ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫਿੜਕਾਅ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ

ਘਰੇਲੂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਨਿੱਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਅਰਕ (5%) : ਇਸ ਅਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਛਾਣੇ ਸੁਕਾਈਆਂ ਨਿੱਮਲੀਆਂ ਲਓ ਅਤੇ



ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਗਤ ਭਰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਬਜਰਾ ਦਾ ਜੂਸ : ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਬਜਰੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਜੂਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋ।

ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ :

'ਚ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲੋ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੋਝ ਛਾਣ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਤਰਲ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਸਾਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀੜਿਆਂ

ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗੁਣ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਮਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਨਿੱਮ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਾਡੀਰੈਕਟਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟੀਫੀਡੈਂਟ ਅਸਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ/ਧਕੇਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਸਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਕੀੜੇ ਦੀ ਉਮਰ, ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਮ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਮਬੀਡਿਨ ਨਾਲ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀਫੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪੌਦੇ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਸਾਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀੜਿਆਂ

ਸਾਰਣੀ : ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ				
ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ	ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਾਤਰਾ	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਮ	ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨਿੱਮ ਦਾ ਘੋਲ	1200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ	100 ਲੀਟਰ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	ਬੈਂਗਣ
ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨਿੱਮ ਦਾ ਘੋਲ	1500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ	100 ਲੀਟਰ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	ਬੈਂਗਣ
	1200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ	100 ਲੀਟਰ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	ਕੱਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਘਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਿੱਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਅਰਕ	(5%)	(5%)	ਮਾਈਟ	ਮਿਰਚ

ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰਿਕ ਹਨ। ਮੱਖੀ ਜਾਂ ਜਵਾਰ ਜਾਂ ਬਜਰਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਗਣ 'ਤੇ ਫਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿੜਕਾਅ ਬੈਂਗਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਗਣ ਵਿਚ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਮ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਸ ਕਿਸਮ

ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀੜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਫਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਏਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਯੋਂ ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਨਕਾਰੀ ਲੇਨੇ ਹੇਰੁ ਪਫੇਂ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸੰਸਾਰ

ਹਿੰਦੀ ਸਾਪ੍ਤਾਹਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਤਰ

ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਏਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸਹਾਯਕ ਧੰਧਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਨਕਾਰੀ ਸੇ ਭਰਪੂਰ

ਏਕ ਵਰ੍ਸ਼ ਮੈਂ 52 ਅੰਕ

ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਯੋਂ ਕ ਡੀਲਰ/ਡਿਸਟ੍ਰੀਬੂਟਰੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਚੰਦ੍ਰਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ

ਏਕ ਵਰ੍ਸ਼ 500/- ਰੁਪਏ

ਦੋ ਵਰ੍ਸ਼ 800/- ਰੁਪਏ

ਖੇਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਪੜਚਾਤ੍ ਅਪਨਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪਰ ਭੇਜੋ :

90410-14575

ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਯਾ TID - 62763351

ਖੇਤੀ ਭੇਜਨੇ ਹੇਰੁ QR ਕੋਡ ਚਕੋਨ ਕਰੋ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸੰਸਾਰ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਿ ਸਾਪ੍ਤਾਹਿਕ)

ਕੇ.ਡੀ. ਕਾੱਮਪਲੈਕਸ, ਗਯਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ, ਪਟਿਯਾਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਈਲੇਜ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਰਜੀਹ

ਤੋਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਵਿਨੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,
ਕ੍ਰਿਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਬਠਿੰਡਾ (ਮੋ.96460-00730)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਫਲਦਾਇਕ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ 2-3 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਸਿਰਫ 62 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਐਸ ਐਮ ਐਲ 1827, ਐਸ ਐਮ ਐਲ 832 ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਲ 668 ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ।



ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ : ਕੱਲਰ ਜਾਂ ਢੰਗ : ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ

ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਿਲ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾਫ਼ਾ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੀ ਏ ਯੂ ਹੋਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਐਮ ਐਲ 1827 ਕਿਸਮ ਲਈ 12 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ



ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ 21-22 ਮਾਰਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ

ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਪੂਰਾ ਬਾਸਮਤੀ 1847 (ਪੀ ਬੀ 1509 ਤੇ ਪੀਬੀ 1692 ਦੀ ਸੋਧ)
ਪੂਰਾ ਬਾਸਮਤੀ 1885 (ਪੀ ਬੀ 1121 ਦੀ ਸੋਧ)
ਪੂਰਾ ਬਾਸਮਤੀ 1886 (ਪੀ ਬੀ 1401 ਦੀ ਸੋਧ)
ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਪੀ ਆਰ 126 (ਫਾਇਰਡੈਸ਼ਨ ਬੀਜ) ਪੀ ਆਰ 131
ਮੂੰਗੀ - ਐਸ ਐਮ ਐਲ 1827, ਐਮ ਐਚ 1142 (ਮਾਂਹ 1008)

ਚਾਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ : ਮੱਕੀ ਜੇ 1006, ਅਫਰੀਕਨ ਟਾਲ, ਬਾਜਰਾ ਪੀ ਸੀ ਬੀ 166, ਗਿੰਨੀ ਘਾਹ, ਮੱਕ ਚਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲੇ :

ਬਰਾੜ ਸੀਡਜ਼
ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਏਯੂ ਗੇਟ ਨੰ: 1, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
Ph. : 0161-2461723, 5088210, 98140-97127, 98158-00034

ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਸੋਲਨ ਦੇ ਇਕ ਖੁੰਬ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਫਲ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਫਾਢੇ ਬਟਨ ਖੁੰਬ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।



ਦਿਨੇਸ਼ ਦਮਾਥੀਆ
ਮੋ. 94177-14390

ਖਾਦ-ਖੁਰਾਕ : ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ 11 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ ਡਰਿੱਲ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਸਿੰਚਾਈ : ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਪੱਕਣਗੀਆਂ।
ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ : ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗੋਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਡੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ (ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ) ਉਸ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੋ।

KSA 9355
SELF PROPELLED
COMBINE HARVESTER

GREENGOLD
TRACTOR DRIVEN
COMBINE HARVESTER

KSA 756 XH
STRAW REAPER

GREENGOLD 220T
TRACK COMBINER HARVESTER

BEW SUPER SEEDER

BEW ROTAVATOR

BEW SEED DRILL

KSP LASER LEVELLER

KS PADDY CHOPPER

ਕੇ.ਐਸ. ਐਗਰੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ.
ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ)

Mob. : 92170 71755, 92170 70755
www.ksagrotech.org | info@ksagrotech.org

ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਾਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਟਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਖੁੰਬ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਧੋ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੰਬਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕ ਲਿਫਾਢਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰਨ ਬਾਕੀ ਲਿਫਾਢਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਟਨ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਲਿਫਾਢੇ ਅਪਣੇ ਸੈੱਡ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ



ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬੱਟਨ ਖੁੰਬ ਦੇ 500 ਲਿਫਾਢਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ

ਅੰਬ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਅੰਬ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸਾ ਅਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤਕਰੀਬਨ 7.9 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਸੁਆਦ ਸਭ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਕਈ ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅੰਬ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੋਗ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ-ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ : ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਮੌਸਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਣੇ ਵਰਗਾ ਪੁੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਲ੍ਹੀ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮ : ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 1.0 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਰਾਥੇਨ (ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ) ਜਾਂ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਗੰਧਕ ਜਾਂ 1.0 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਕੋਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਕਾਅ ਬੂਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜਾ ਬੂਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਫਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਿੱਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਵਰੀਤ ਖਹਿਰਾ, ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ