

ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਖਬਾਰ

Rs.10/-

www.khetiduniyan.in

Postage Regd. No. PB/PTA/0338/2025-2027

Editor : Jagpreet Singh • RNI 42269/83 (PUNPUN00806) • Issue Dated 22-08-2026 • Vol.44 No.34 • M. 90410-14575 • Page 16 E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com



ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਮ-ਓ-ਨਿਸ਼ਾਨ!



ਤੀਨ ਤਿਗੜੇ, ਭੂਰੇ ਟਿੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜੇ!



ਭੂਰੇ ਟਿੱਡੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਲਈ ਉੱਨਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਮਾਧਾਨ



ਕ੍ਰਿ-ਕੈਲਮੈਕਸ

ਪੌਸ਼ਣ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਸਲ ਧਮਾਲ

- ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਣ • ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੁਟਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ • ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਦਾਣਾ

9 ਪੌਸ਼ਕ
ਤੱਤਾਂ ਦੀ
ਤਾਕਤ



18-20%
ਜ਼ਿਆਦਾ
ਉਪਜ



ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਧੀ : 500 ਮਿ.ਲੀ. ਕ੍ਰਿ-ਕੈਲਮੈਕਸ
ਨੂੰ 150-200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ
ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਪਹਿਲਾ ਸਪਰੇਅ : ਫੁਟਾਰੇ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ
ਦੂਜਾ ਸਪਰੇਅ : ਸਿੱਟੇ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ



ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਰਸਾਇਣ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ

1115, ਹੇਮਕੁੰਟ ਟਾਵਰ, 98, ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110019

ਵੈਬਸਾਈਟ : www.krepl.in | ਈਮੇਲ : krepl.delhi@krepl.in

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਜ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰ **1800-572-5065** 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Follow us on: @krishirasayan73

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 'ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ...

“ਮੱਕੀ ਗੁੱਝਦਾ ਜੱਟ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ” ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਸਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਗੁਡਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁੱਝਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਨ ਕਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੱਕੀ ਚੰਗੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾ ਤੋਂ ਭਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ



ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅੱਧੀ

ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮੋਬਾਇਲ : 94176-20311

ਬਿਜਾਈ, ਬੀਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਹੀ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ

ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀ ਵੱਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਇਸ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ

ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ

ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਬੈੱਡ ਪਲਾਟਰ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ

ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ

ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਸਾਉਣੀ (ਖਰੀਫ) ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3-4 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਬਹਾਰ ਰੁੱਤ (ਸਪਰਿੰਗ) ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।



ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ

ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮਤਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ (ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜਰ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ

ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਟਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਰਾ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਾਈ

ਸਮਤਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ ਵਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪਲਾਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੱਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਗੌਰ

ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੋਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ



ਨਾ ਭਰੋ (ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ)। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮਿੱਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਯੋਸ਼ੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਹੁੰਜਨ,
ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ. ਏ. ਯੂ.,
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋ. 97799-07040)

ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖੇਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ 10% ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ 1-1.5% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨਿਸਰਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਤ ਬਾਲਾਂ ਸਿੱਟੇ ਉਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਤ ਬਾਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦਾ ਉਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗੋਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨਿਸਰਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਣ, ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਵਕਫੇ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਾਪਮਾਨ (25-35°C) ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ



ਝੋਨੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ

ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
★ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

★ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਸਾਈਡ 46 ਡੀਐੱਫ @ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗੋਲੀਲਿਓ ਵੇਅ 18.76 ਐੱਸਸੀ @ 400 ਮਿਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

★ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਲੋੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਪਰਖ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

★ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਿਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਨਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ। ਮੌਸਮ



ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਬਿਹਤਰ ਫਸਲ

CONTACT: 8286014051 | 9216103075 | 9216103069

ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਮੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚੇ

ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛਿੜਕਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ 6 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 10 ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 6 ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

★ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਟਰ



ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸ ਨਿੱਥੀਸੀਡੀਨ ਜਾਂ ਅਜੂਕ ਜਾਂ 1200 ਚੁਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਲ ਤਿਆਗ (ਚਿਪਚਿਪਾ) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਖੀ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਮਰੋੜ ਬਿਮਾਰੀ (ਲੀਫ ਕਰਲ) ਵੀ

ਬਾਕੀ ਸਫਾ 6 'ਤੇ



ਕੇ ਐਸ ਗਰੁੱਪ
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ



ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ

4 IN 1 COMBO

BEW ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ



- ਲੋਨ ਉਪਲੱਬਧ
- ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲੱਬਧ
- ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
- ਪਾਉਡਰ ਕੋਟਿੰਗ ਪੇਂਟ
- ਪੇਟੇਂਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ

TOLL FREE NUMBER
1800-120-004455

- BHAGWAN ENGINEERING WORKS
- KS AGROTECH PVT. LTD.
- KS POWERTECH PVT. LTD.

Raikot Road, Malerkotla - 148023, Distt. Sangrur Punjab
M. : 92170-70755, 92170-71755

E-mail : sales@ksagrotech.org, info@ksagrotech.org
www.ksagrotech.org, www.bewindia.co

ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਤਾਹਿਕ

KHETI DUNIYAN

An Exclusive Agricultural Weekly

ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ :

9-ਏ, ਅਜੀਤ ਨਗਰ,
ਪਟਿਆਲਾ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਫਿਸ :

ਕੇ.ਡੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ, ਗੁਰੂਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ,
ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ,
ਪਟਿਆਲਾ-147001

ਮੋ.90410-14575

ਈ-ਮੇਲ : khetiduniyan1983@gmail.com



www.khetiduniyan.in

ਸਾਲ 44 ਅੰਕ 34
ਮਿਤੀ 22-08-2026

ਐਡੀਟਰ

ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਫਤਰ

ਪਟਿਆਲਾ

ਫੋਨ : 0175-2214575

ਮੁੰਬਈ

ਦਿੱਲੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਬਠਿੰਡਾ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ

ਡਾ. ਡੀ.ਡੀ. ਨਾਰੰਗ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਡਾ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਤਰਾ

ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਲਾਠਰ

ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ

ਏਕਤਾ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼, ਪਟਿਆਲਾ

ਨੋਟ

- ★ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ, ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ★ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ।
- ★ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Editor : JAGPREET SINGH,

Printer, Publisher and Owner of Weekly

'KHETI DUNIYAN' Printed at Drishti Printers,

484, Nagra Street, Natan Wali Gali, Backside Dashmesh Market,

Near Sher-e-Punjab Market, Patiala-147001 (Pb.)

and published from Kheti Duniyan, House No. 9-A, Ajit Nagar,

Patiala-147001 (Pb.). E-mail : khetiduniyan1983@gmail.com

RNI No.PUNPUN00806

ਕਦੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ

ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ ਅਕਸਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖਾਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਬੱਧੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਗੈਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇਯੋਗ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।

ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੋਡਿਆਂ ਜਾਂ ਲੱਕ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈ- ਲਾਈਵ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਨਹੋਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ

ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਫਤਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈ. ਟੀ. ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ



ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਇਨ, ਕੁਰਲਾ, ਅਧਿਰ ਤੇ ਦਾਦਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਨੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਰੀਡਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟੇ, ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੇ ਰੇਪਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ

ਮੁਹੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਬੜ-ਖਾੜ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਜੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

- ਦੇਵੀ ਐੱਮ. ਚੇਰੀਅਨ

★ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਓ।

★ ਖੇਤ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

★ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀ ਏ ਯੂ-ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

★ ਹਰ ਵਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ।

★ ਜਦੋਂ ਵੀ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਟਿੱਕੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ 30 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਓ।

★ ਜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਟਿੱਕੀ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

★ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਬਾਸਮਤੀ

★ ਲੁਆਈ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀ ਏ ਯੂ-ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

ਪੀ ਏ ਯੂ-ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਵਿਧੀ



★ ਹਰ ਵਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 10 ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੌਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ।

★ ਜਦੋਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੰਬੰਧਤ ਟਿੱਕੀ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ 9 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਓ।

★ ਜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

★ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਓ।

ਨੋਟ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ/ਹਰੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਫਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ / ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗੇਟ ਨੰ. 1 ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਕੌਲ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ

ਕੇ. ਕੇ. ਗਿੱਲ, ਫਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ. ਏ. ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋ. 81464-00233)

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਆਪਣਾਓ।

ੳ. ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ

ਗੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

2. ਮਿਆਰੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਵਰਤੋਂ : ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ, ਟਿਕਾਉ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਟੁੰਬਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਮਸ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਟੁੰਬਾਂ ਲਈ ਕੋਲ ਦੀ

ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਮੋਮੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅਭਿ ਅਤੇ ਸੰਭੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

2. ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ : ਕਟੁੰਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ,



ਨੀਵੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ/ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਕੜੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਫੱਟੀ ਕੱਢ ਦਿਓ।

ੲ. ਕਟੁੰਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਕਟੁੰਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਮਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਟੁੰਬ ਵਿੱਚ ਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲਨ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣਾਓ।

1. ਕਟੁੰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣਾ : ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ-ਪਾਲਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੰਡ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

2. ਖੰਡ ਦਾ ਘੋਲ ਦੇਣਾ :

ਨੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਟੁੰਬ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਘੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ 1:1 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦਾ ਘੋਲ ਕਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਰੇਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਕੜੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿੰਗ ਕਿਹਾ

ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ।

2. ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ : ਖੁਰਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਖੁਸ਼ੁੱਟ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।

3. ਵੱਧ ਬੱਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਕੜੇ ਕਟੁੰਬ ਰੱਖਣਾ : ਘੱਟ ਬੱਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਟੁੰਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਟੁੰਬ ਰੋਬਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਤੱਕੜੇ ਕਟੁੰਬ ਉਪਰ ਮੋਮੀ ਕੀੜੇ, ਭਰਿੰਡਾਂ/ਦੰਦਈਏ, ਕਾਲੇ ਕੀੜੇ/ਕੀੜੀਆਂ, ਹਰੀ ਚਿੜੀ, ਕਾਲੀ ਚਿੜੀ



ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ।

1. ਕਟੁੰਬਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ : ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਕਟੁੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਾਓ। ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆਮ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਟੁੰਬ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਹਰਲਾ ਗੇਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਬੋਤਲਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਟੁੰਬ ਦੇ

ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਝੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ : ਕਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਬਾਂ / ਦਰਾੜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਬ, ਸਫ਼ੇਦੇ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅ. ਕਟੁੰਬ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰੱਖਣਾ

1. ਕਟੁੰਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ : ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਟਮ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਏ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੀਬਾਂ/ਤਰੇੜਾਂ



ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਬਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ।

1. ਕਟੁੰਬ ਦਾ ਗੇਟ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ : ਹਾਈਵ ਦਾ ਗੇਟ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿੱਪ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਟੁੰਬ ਵਿੱਚ

ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਜੀਵੀ ਮਾਈਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ,
ਕੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ
ਵਿਭਾਗ, ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ
ਮੋਬਾਇਲ : 94172-30896

ਸਿਰਕਾ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਨਅ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10 ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਨਉਟੀ ਸਿਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕਾ ਸਿਹਤ ਭਰਪੂਰ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਅਮੀਨੋ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਐਸਟਰ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਸਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਰਸ ਵਿਚਲੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਐਸਟਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਬ, ਚੈਰੀ, ਅੰਬ, ਗੰਨਾ, ਆਲੂਬਖਾਰਾ, ਸਟਰਬੇਰੀ, ਅਨਾਨਾਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਿਰਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ (ਬਿਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧੀ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕਾ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਨੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕਾ ਗੰਨਾ, ਅੰਗੂਰ, ਸੇਬ, ਸੇਬ-ਗੰਨਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਜਾਮਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਗ (ਖਮੀਰ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜਾਗ ਅਤੇ 500 ਮਿਲੀ. ਮਦਰ ਸਿਰਕਾ) ਪੀਏਯੂ. ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ



ਵਧੀਆ
ਸਹਾਇਕ
ਕਿੱਤਾ ਹੈ

ਗੰਨੇ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

ਸੈਂਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸਮੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਘਣਤਾ 15 ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਦੇ ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਮੀਰ ਦਾ ਜਾਗ (5-7.5%) ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਨੂੰ 28-30 ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਘਣਤਾ 0 ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (5%) ਅਤੇ 10% ਮਦਰ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 28-30 ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ ਲਈ 60-65 ਦਰਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ 15ਬੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬ੍ਰਿਕਸ-ਜਾਗ (ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਐਸਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜਾਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਰਕਾ, ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਨ- ਚੰਗਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਕੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ- ਰਸ ਦੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੌਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਾਬਾਈਸਲਫਾਈਟ (1 ਗ੍ਰ./10 ਲਿ.) ਫਾਨਣੀ, ਮਲਮਲ ਦਾ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ।

ਲਾਗਤ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ 500-1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ (10-50 ਲੀਟਰ), ਕਾਟੋਜ (50 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ (1000 ਲੀਟਰ ਤੇ ਹੋਰ) ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 36 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੈਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਬੈਚ 81 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 250 ਲਿਟਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ 750 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 225 ਬੋਤਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 225 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 10,075 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਲਾਗਤ 45 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 130 ਲੀਟਰ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ 650 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ 120 ਬੋਤਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 120 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 7560 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਔਸਤ ਲਾਗਤ 63 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੇਬ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੀਟਰ ਰਸ ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 125 ਬੋਤਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 36.64 ਤੇ 29.2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਚ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਲਿਟਰ ਜੂਸ ਤੋਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ 70 ਬੋਤਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਲਗਭਗ 36 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ. ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ 50 ਲਿਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ, ਅੰਗੂਰ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਜਾਮੁਨ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60 ਰੁਪਏ, 84 ਰੁਪਏ, 183 ਰੁਪਏ ਅਤੇ

60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਾ

ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਔਸਤਨ 100 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ. ਵਲੋਂ ਸਿਰਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੀਏਯੂ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ (ਕੀਮਤ 20 ਰੁਪਏ) 'ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ' ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ. ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੀਏਯੂ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਟੇਂਟਿੰਗ ਸੈਲ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਸਫਾ 3 ਦੀ

ਨਰਮੇ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਰੋਕਥਾਮ

★ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਕਲਾਸਟੋ 20 ਡਬਲਯੂ ਜੀ (ਪਾਇਰੀਫਲੂਕੀਨਾਜ਼ੋਨ) ਜਾਂ 400 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਸਰੀਨਾ 50 ਡੀ ਸੀ (ਅਫਿਡੋਪਾਇਰਿਨ) ਜਾਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਓਸੀਨ 20 ਐਸ ਜੀ (ਡਾਇਨੋਟੇਫੂਰਾਨ) ਜਾਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਉਲਾਲਾ 50 ਡਬਲਯੂ ਜੀ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
★ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

★ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਗਣ, ਖੀਰਾ, ਚੱਪਣ ਕੱਦੂ, ਤਰ, ਆਲੂ,



(ਫਲੋਨਿਕਾਮਿਡ) ਜਾਂ 800 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਫੋਸਮਾਈਟ / ਈ-ਮਾਈਟ/ ਵਾਲਬੀਆਨ / ਗੋਲਡ ਮਿਟ 50 ਈ ਸੀ (ਈਥੀਆਨ) ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

★ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਨਿੱਛੇ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਲੈਨੋ 10 ਈ ਸੀ (ਪਾਈਰੀਪਰੋਕਸੀਫਿਨ) ਜਾਂ 200 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਓਬਰੇਨ/ਵੋਲਟੇਜ 22.9 ਐਸ ਸੀ (ਸਪੈਰੋਮੈਸੀਫਿਨ) ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ

★ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧੇਰੇ

ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚਾਂ, ਮੂੰਗੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੋ।

★ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ 40 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।

ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ. ਏ. ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋ. 97794-51214)

ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਜਰ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਸ਼ਤ

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰੂਮਾ ਦੇਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ,
ਪੀ. ਏ. ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋਬਾਇਲ : 94640-37325)

ਗਾਜਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਿਆਰ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਗਣ ਲਈ 7-24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇ ਲਈ 18-24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਲਈ 15-20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ, ਭੁਰਭੁਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਲਈ ਰੇਤਲੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ 134.25 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ 5.58 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 218 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰੋਸ਼ਨੀ : ਇਹ ਪੀਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਲਗਭਗ 96 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਊਟੀਨ ਅਤੇ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 211 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।

ਪੀ.ਸੀ.-161 : ਇਹ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ 8.88 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ



ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ : ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ; ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਾੜ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ; ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, ਗਾਜਰ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਲਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜਾਮਣੀ : ਇਹ ਲਗਭਗ 92 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ

ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ / 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੀ. ਐਸ. ਐਸ. 9.5% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 256 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ : ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਾਮਣੀ-ਕਾਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ 90-95 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ 182 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੀਨੋਲਿਕ ਤੱਤ 73 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 196 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਸੀ, ਜੂਸ, ਅਚਾਰ, ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਰਾਕੀ ਚੰਗੇ



ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ।

ਪੀ. ਸੀ.-100 : ਇਹ ਲਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 87 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ 8.87 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੀ. ਐਸ. ਐਸ. 7.23% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 117.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।

ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ : ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਵੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 7.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਲਗਭਗ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਜਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਡ ਮੇਕਰ-ਕਮ-ਸੋਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 67.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੈਂਡ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਬੀਜਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ : ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਰੂੜੀ 15 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਂ ਦਿਓ। ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ 25 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (55 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ), 12 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ (75 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ) ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ (50 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਓ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ : ਫਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਧੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜਰ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿੰਚਾਈ : ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਜੰਮ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਬੇਢੰਗੀਆਂ, ਬੇਰੰਗ, ਬਰੀਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਾ ਗਾਜਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੁਟਾਈ : ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਜਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 90-100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਜਰਾਂ ਮੰਡੀਯੋਗ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲ, ਜਾਮਨੀ, ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪੁਟਾਈ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 67.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਾਜਰ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 0.62 ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਪੁਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਧੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਪੁਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੱਧ ਝਾੜ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਪੁਟਾਈ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ, ਪੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਗਾਜਰਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਜਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀ-ਮੁਖੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀ ਏ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 1967 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੀ ਏ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬੋਲੋਵਾਲ ਸੋਖੜੀ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ

ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਸਟੀਕ ਖੇਤੀ (Precision Agriculture), ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ/ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਚਾਰ, ਜੌਮ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਬੀਜ਼, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਮੂਲ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਐਸ਼ੀਏ ਪੌਦੇ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਭ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼



ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡ ਡ੍ਰਿਲ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਰ, ਡਰੋਨ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਮਲਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵਹਾਈ, ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੋਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣਾ, ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀ-ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁੰਭ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਏਯੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ ਏ ਯੂ

ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ

ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਏ ਯੂ ਉਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਥਾਨ	ਮਿਤੀ
ਨਾਰਗਲ-ਜਹਾਂਗੀਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)	9 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ)
ਬੋਲੋਵਾਲ ਸੋਖੜੀ	11 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ)
ਰੋਣੀ (ਪਟਿਆਲਾ)	15 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ)
ਪੀ. ਏ. ਯੂ., ਲੁਧਿਆਣਾ	18-19 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ-ਸ਼ਨੀਵਾਰ)
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ	22 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ)
ਬਠਿੰਡਾ	25 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ	29 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ)

ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਗਰੋ ਆਧਾਰਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।



ਉਦਯੋਗ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਵੇਂ ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸਲ ਵਰਤੋਂ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਕਸਾਰ ਨਦੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ,

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ



Crop Chemicals

ਬਿਰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਬਿਰਤਰ ਫਸਲ

CONTACT: 8288014051 | 9216103075 | 9216103059

ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿ

ਡਾ. ਹਰਪਾਲ
ਪੀ ਏ ਯੂ ਰਿਜਨਲ ਰਿਸਰਚ



“

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਸੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। 140 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਅਤੇ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹਦਰਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ



ਉਦਯੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿਕੋਣੀ ਸਭ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ

ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੋ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਦਿਨ-ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ-ਚੋਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ

ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੱਕ, ਪੀ ਏ ਯੂ ਨੇ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ

Crop Chemicals

ਬਿਰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਬਿਰਤਰ ਫਸਲ

CONTACT: 8288014051 | 9216103075 | 9216103069

ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ



ਨਾਨ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ
ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ -
ਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ,
ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ।

- ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

CBC 22201/13/0021/2627

ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦੀਮੀ ਸਾਂਝ

ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਧੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜ ਦੀਆਂ ਪਰਾ-ਵੇਗਲੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 'ਓਜ਼ੋਨ' ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਛਤਰੀ ਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਛੇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਸਰ, ਦਮਾ, ਹੈਜ਼ਾ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਅਲਰਜੀ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਾਧੁ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਹਿਤ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ ਤਕ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਨੁਵਾਹ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੁਝਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟਮਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੁਗ-ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਫੈਲੀ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਣਦਾਤਾ-ਹਵਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਤ ਕਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਲਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਖ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਫਲ-ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਰੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਰੇ ਤੇ ਸਥਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਣ/ਜੰਗਲ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਆਰੰਭ) ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਤਮ-ਤੱਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮੌਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਪਲ ਉੱਤੇ ਪੀਘਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਦਮਾ, ਮਲੇਰੀਆ, ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ-ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਛਿੱਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਛਿੱਲ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਣਨ, ਮੋਮ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਹਮ' ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਪਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਪਲ 'ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਪਿੱਪਲ ਦਿਆ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ, ਕੇਹੀਆ ਛੋਡੀਆਂ ਲਗਾਂ ਵੇ ?

ਢੋਲ ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰਾ, ਕੌਣ ਲਿਆਵੇ ਖਬਰਾਂ ਵੇ ?

ਬੋਹੜ, ਬੜ ਜਾਂ ਬਰੋਟਾ ਆਪਣੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਲਈ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਗਿਲੀ-ਮੁਨੀ ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ

ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿਕਿਤਸਕ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਦੁੱਧ, ਛਿੱਲ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਨਕਸੀਰ, ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਨ ਵਲੋਂ ਬਰੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਸ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਰੋਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ :

ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਬਰੋਟਿਆ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹੀ।

ਖੜ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਕਾਵਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੋਸ। ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਕੋਸ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਆਵਦਾ, ਵੇ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਦੇਸ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਪੀਘਾਂ ਬੂਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵਿਯੋਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਘਾਂ ਬੂਟਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੜਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਕਿੱਕਰ', 'ਭਾਰਤੀ' ਤੇ 'ਪਹਾੜੀ' ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ :

ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਧ ਕਿੱਕਰੇ

ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣਾ।

ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਿੱਲ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਚਮੜਾ-ਰੰਗਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਕ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਤੁੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਗਰਾਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਕੰਦ ਫੋੜੇ-ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਲ ਤੇ ਪੇਟ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫੁੱਲ ਲਕੌਰੀਆ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ। ਤੁੱਕੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਦਾਤਣ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ :

ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵੇ ਦਾਤਣ ਕਿੱਕਰ ਦੀ।

ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਛਾਂਦਾਰ 'ਟਾਹਲੀ' ਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬਣ ਆਪਣੇ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਚਰਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ :

ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਬਣਵਾ ਦੇ।

ਏਸ ਚਰਖੇ ਦਾ ਹਿੱਲੇ ਮਝੇਰੂ, ਮਾਲੂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਵੇ।

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੱਤ ਕੇ ਸੌਂ ਗੀਆਂ,

ਮੈਥੋਂ ਕੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਚਰਖਾ ਬੂ ਚੰਦਰਾ,

ਸਾਡੀ ਅੱਲੜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗੁਆਵੇ।

ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ,

ਪਲੰਘ, ਹਲ, ਪੰਜਾਲੀ, ਗੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ

ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਠੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ

ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਛਿੱਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਰਮ-ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ

ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਫੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ

ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ

ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਬੇਰੀ' ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬੜੀ ਉਪਯੋਗੀ

ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਡੂ ਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਰ

ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ

ਪਿਉਂਦੀ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਮਾਖਿਉਂ

ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵੀ

ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

ਠੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ। ਬੇਰੀ ਦੇ

ਪੱਤੇ ਸਿਰ ਧੋਣ ਤੇ ਕੋਸ ਲਮੇ ਕਰਨ ਲਈ

ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਛਿੱਲ ਦਾ

ਰਸ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ

ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਬੂਰ

ਵਿਯੋਗਣ ਨੂੰ ਲਾਮ 'ਤੇ ਗਏ ਮਾਰੀ ਦੀ

ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀ

ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਬੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ

ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ :

'ਤੇਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਖੇਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ,

ਵੇ ਬੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ।'

'ਤੂਤ' ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ

ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ

ਉਸ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਤੇ ਠੰਢੀ ਛਾਂ ਮਹਿਸੂਸ

ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ

ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਣ

ਨਾਲ ਤੂਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੇ-ਮਿੱਠੇ

ਤੂਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਖੂਬ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂਤ ਦੀਆਂ

ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦਾਤਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ

ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜ ਚੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ

ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ

ਦੀ ਸੱਸ-ਮਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ

ਚੀਣ-ਬੂਲਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ

ਬੋਲੇ, ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ

ਦੇ ਰੈਕਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮ' ਦੌਰਾਨ ਤੂਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲੰਮ-ਸਲੰਮੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ :

ਮੁੰਡਾ ਰੋਹੀ ਦੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਜਾਤੂ
ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂਤ ਦੀ

ਛੋਟੀ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 'ਅੰਬ' ਫਲਾਂ ਦਾ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇਗੱਲ

ਕੀ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ

ਪਸੰਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਲਾਮੀ, ਚੌਸਾ,

ਸੁਰਖਾ, ਰਸਪਰੀ, ਮਾਲਦਾ, ਬਦਾਮੀ, ਸਫੈਦਾ,

ਤੋਤਾ, ਦੁਸਹਿਰੀ, ਲੰਗੜਾ, ਚੂਪਾ ਜਾਂ ਗਧਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਬ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖਰਾ

ਸੁਆਦ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਬ ਚੂਪਣ

ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ

ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ 'ਏ' ਅਤੇ 'ਸੀ' ਕਾਫੀ

ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ

ਚਟਣੀ, ਅਚਾਰ, ਜੈਮ, ਮੁਰੱਬਾ ਅਤੇ ਆਮਪੰਨਾ

ਸੁਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਲਈ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਬ ਪਾਪੜ, ਸਕਵੇਜ਼, ਮੈਂਗੋ ਫਰੂਟੀ ਅਤੇ

ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ

ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ

ਹੈ ਤੇ ਕੋਇਲ ਮਿੱਠੇ-ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ

ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦੀਆਂ ਪਿਆਰ

ਤਰੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ

ਰਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਇਉਂ

ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ :

ਬੋਲੀ ਅੰਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਇਲ ਮੇਰੇ

ਹਾਣੀਆਂ,

ਵੇ ਤੱਤੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਆਲੇਖ ਦੇ ਆਰੰਭ

ਵਿਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ

ਰਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਨੁਵਾਹ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ

ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ

ਲੋਅ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ

ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 'ਖੰਡ

ਬਾਬ ਦੁਪ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਰਖਾਂ ਬਾਬ ਨਾ

ਛਾਵੇਂ'। ਸੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ

ਲਈ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ

ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ

ਕੰਮ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ

ਕੇਵਲ ਮਾਨਵ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ

ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ

ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਾਜਵੰਤ ਪੰਜਾਬੀ,

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,

ਪਟਿਆਲਾ (ਮੋ. 8567886223)

ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਸ਼ਵੱਥ ਵੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਖੋਭ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ

ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਚੰਗਾ ਬੂਟਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗਮਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ



ਰਸੋਈ (ਘਰੇਲੂ) ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ

ਵਿੱਚ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਮਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਤਲੇ 'ਤੇ ਇੱਟ-ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਖਾਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੁਰਝਾ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲ੍ਹੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਧੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟਮਾਟਰ, ਭਿੰਡੀ, ਮਿਰਚ

ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਭ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਝੁਲਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ।

ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨਾ ਬੀਜੋ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਦਬਾਓ। ਧਨੀਆ, ਮੇਥੀ, ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਸੋਈ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਪਜਾਊਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

- ਅਨੂ ਆਰ.

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਦਾਰ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਭਾਲ

“

ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

”

ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦੇ

ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਉੱਚਾਈ

ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨ੍ਹ, ਹੋਰ

ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ, ਅੰਬ, ਅਮਰੂਦ, ਲੀਚੀ, ਲੁਕਾਟ ਅਤੇ ਸਪੋਟਾ ਆਦਿ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਮਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਟਾਹਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੋ. 98152-25555

ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਡੀ, ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਲਚਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਲਚ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਣੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਰ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਲੀਚੀ ਆਦਿ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ

ਫਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਵੂਵਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਥੈਲਾਬੰਦੀ



ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਟਰੈਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀੜੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਥੈਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ

ਫਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਰਸਾਤੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਨ-ਵੂਵਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੀ ਥੈਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਥੈਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ
ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹੋ।

ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਜਲਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ-

- ★ ਰੋਗ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ
- ★ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ
- ★ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ



Crop Chemicals

ਬਿਰਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਬਿਰਤਰ ਫਸਲ

CONTACT: 9288014051 | 9216103075 | 9216103069

- ★ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ
- ★ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ

ਅਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਫਿੰਗਰਲਿੰਗ, ਛੋਟੇ ਫਰਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ (Predators) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬਿਰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਚਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫਿੰਗਰਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਕਿੰਗ ਘਣਤਾ

ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਟਾਕਿੰਗ ਘਣਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਲਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕਿੰਗ ਘਣਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਲਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਕਿੰਗ ਘਣਤਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ-

- ★ ਜਲਸ਼ੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ
- ★ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ★ ਪੌਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
- ★ ਮੌਜੂਦਾ ਮੱਛੀ ਆਬਾਦੀ
- ★ ਜਲਸ਼ੇ ਦੀ ਵਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਹਨ ਸਮਰੱਥਾ

★ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਜਲਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਸ਼ੇ ਦੀ ਵਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਘਣਤਾ

ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਾਧਾ

ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੀ. ਐਚ. ਡੀ. (Fisheries Resource Management)
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, M.F.Sc. Aquaculture, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫਸਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕੇਵਲ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਵਾਸ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਆਵਾਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-

- ★ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ
- ★ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
- ★ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
- ★ ਜਲ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ
- ★ ਨਕਲੀ ਮੱਛੀ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਗੰਢ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ
- ★ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
- ★ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡੇ ਗਏ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

- ★ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ
- ★ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ
- ★ ਪ੍ਰਤੀ ਯਤਨ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਦਰ
- ★ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ
- ★ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ★ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
- ★ ਕੁਦਰਤੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੇ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-

- ★ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਡੀਐਨਏ

- ★ ਧੁਨੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੱਛੀ ਸਰਵੇਖਣ
- ★ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
- ★ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ
- ★ ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ★ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
- ★ ਸਟਾਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲ

ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ, ਉਚਿਤ ਸਟਾਕਿੰਗ ਘਣਤਾ, ਮੱਛੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ



ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ-

- ★ ਮੱਛੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
- ★ ਸਥਾਨਕ ਮੱਛੀ ਭਾਈਚਾਰੇ
- ★ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ
- ★ ਪੋਜ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ
- ★ ਹੋਚਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
- ★ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ
- ★ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-
- ★ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
- ★ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

★ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
★ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (Catch Data) ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ
★ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ
★ ਜਲਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ

ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਸ਼ੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-

- ★ ਪ੍ਰਾਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ
- ★ ਬਲੂ ਰੋਵੇਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ★ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
- ★ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-

- ★ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
- ★ ਹੋਚਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
- ★ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟਾਕਿੰਗ
- ★ ਕੋਜ਼ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
- ★ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
- ★ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ
- ★ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਕ ਵਾਧਾ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-

- ★ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
- ★ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟਾਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
- ★ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਟਾਕਿੰਗ
- ★ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ
- ★ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
- ★ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਨਸ਼ਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
- ★ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ
- ★ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ
- ★ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਘਾਟ
- ★ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ-

- ★ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ★ ਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ
- ★ ਹੋਚਰੀ ਬਹੁਭੂਸ਼ਟਾਕ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ★ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ★ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ
- ★ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਡੀਐਨਏ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ★ GIS ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਲਸ਼ੇ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
- ★ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ★ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ★ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ
- ਰਵਾਇਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਟਾਕ ਵਾਧਾ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਹੋਚਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਿੰਗਰਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮੱਛੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕੇਵਲ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀ ਬੀਜ, ਸਹੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਘਣਤਾ, ਆਵਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਡੀਐਨਏ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਧੁਨੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਵਾਧਾ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਲਾਸ਼ੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ

ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਵਧੀਆ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬੂਟੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਲੇਬਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਫ਼ਲ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ, ਅਮਰੂਦ, ਅੰਬ, ਬੇਰ, ਲੀਚੀ, ਚਿਕੂ, ਪਪੀਤਾ, ਲੁਕਾਨ, ਖਜੂਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਫ, ਆੜੂ, ਅਲੂਚਾ, ਅਨਾਰ, ਫਾਲਸਾ ਤੇ ਅੰਜੀਰ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਵਲਾ ਤੇ ਕੇਲਾ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬੂਟੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਾਚੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਅਮਰੂਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਸਫੈਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਫੈਦਾ, ਹਿਸਾਰ, ਸਫੈਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਕ, ਹਿਸਾਰ ਸੁਰਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਬ ਪੂਸਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਮਰਪਾਲੀ, ਮਲਿਕਾ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਧਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ, ਮਲਿਕਾ, ਅਲਫੋਜੋ, ਲੰਗੜਾ, ਚੌਸਾ ਆਦਿ ਚੂਪਣ ਲਈ ਗੰਗੀਆਂ, ਸੰਧੂਰੀ, ਜੀਐਨ-1, ਜੀਐਨ-2, ਜੀਐਨ-3, ਜੀਐਨ-4, ਜੀਐਨ-5, ਜੀਐਨ-6 ਅਤੇ ਜੀਐਨ-17 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੀਚੀ ਦਹਿਰਾਦੂਨ, ਕਲਕੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਡਲੈਂਸ ਲੇਟ ਅਤੇ ਅੰਵਲਾ ਐਨਏ-



ਬਾਗ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ

7, ਐਨਏ-10, ਬਲਵੰਤ, ਨੀਲਮ, ਕੰਚਨ, ਚਕੋਈਆ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਪੀਤਾ ਹਨੀ ਡਿਊ, ਪੂਸਾ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟ ਰੋਡ ਲੇਡੀ-786 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਜੀਰ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਬਰਾਉਨ ਟਰਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜੂ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਫਲੋਰੈਂਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਅਰਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਕਟਰੀਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਨੋਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਬਾਇਰਾਇਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ3 ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਬੀ6 ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਫ਼ਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੰਵਲਾ, ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਟਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੇਪ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਮੋਨਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ

ਕਾਰਨ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅੰਜੀਰ, ਲਾਈਮ, ਲੈਮਨ ਤੇ ਅੰਵਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆੜੂ, ਫਾਲਸਾ, ਬੇਰ ਆਦਿ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਲ ਦਮੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਰਿਟਾ.) ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਅਮਰੂਦ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਡਾ. ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਰੋਕੂ ਵਾੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ।



ਹਵਾ ਰੋਕੂ ਵਾੜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਬੂਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਲ ਅੰਬ, ਜਾਮੁਨ, ਬਿੱਲ, ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਹਿਸਾਸ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਲਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਲਨੀਨੋ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਠੰਢ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਨੀਨੋ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸ਼ਨਿਕ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਨੋਆ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਲਨੀਨੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਲਨੀਨੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ, ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਣ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਨੀਨੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਨੀਨੋ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2.9 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ



ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪ- ਕੈਟਲਾ (ਕੈਟਲਾ ਕੈਟਲਾ), ਰੋਹੂ (ਲੇਬੀਓ ਰੋਹਿਤਾ) ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਲ (ਸਿਰੀਨਸ ਮ੍ਰਿਗਲਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ - ਆਮ ਕਾਰਪ, ਘਾਹ ਕਾਰਪ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਪ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪ ਤਲਾਅ-ਅਧਾਰਤ ਜਲ-ਖੇਤੀ



ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਬਿਹਤਰ ਫਸਲ

CONTACT: 8288014051 | 9216103075 | 9216103069

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਉੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਕਾਰਪ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰੀਕ ਜਾਨਵਰ ਹਨ।

ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

- ★ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਫੀਡ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
- ★ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ
- ★ ਪਲੈਕਟਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ)
- ★ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ
- ★ ਪ੍ਰਜਨਨ ਚੱਕਰ

ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ

ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ :

1. ਨਰਸਰੀ ਤਲਾਬ : ਸਪੋਨ → ਫਰਾਈ (2-3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ)
 2. ਤਲਾਬ ਪਾਲਣ : ਫਰਾਈ → ਫਿੰਗਰਲਿੰਗ (8-12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ)
 3. ਸਟਾਕਿੰਗ ਤਲਾਬ : ਫਿੰਗਰਲਿੰਗ → ਟੇਬਲ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ
- ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਕਾਰਪ ਪੋਲੀਕਲਚਰ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ਹੈ :

- ★ ਸਤਹੀ ਫੀਡਰ (ਕੈਟਲਾ, ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਪ)
 - ★ ਕਾਲਮ ਫੀਡਰ (ਰੋਹੂ)
 - ★ ਹੇਠਲੇ ਫੀਡਰ (ਮ੍ਰਿਗਲ, ਆਮ ਕਾਰਪ)
- ਇਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਈਅਦ ਸ਼ਬੀਹ ਹਸਨ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਵਨਿਆ,
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ
ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ-141004 (ਪੰਜਾਬ)

ਕਾਰਪ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਮਾਰਚ-ਜੂਨ)
ਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ

- ★ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ (30-40°C)
- ★ ਘੱਟ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਆਕਸੀਜਨ
- ★ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ
- ★ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ



ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ

1. ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
- ★ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1.5-2 ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
- ★ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
2. ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਯੰਤਰਣ

★ ਏਰੀਏਟਰ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਹੱਥੀ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੋ।

- ★ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਮ ਹੈ।
- 3. ਭੋਜਨ ਰਣਨੀਤੀ
- ★ ਠੰਢੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਵੇਰ/ਸ਼ਾਮ) ਭੋਜਨ ਦਿਓ।
- ★ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

4. ਖਾਦ ਨਿਯੰਤਰਣ
- ★ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮ ਕਰੋਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਾਦ ਘਟਾਓ।

5. ਚੂਨਾ

- ★ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂਨਾ ਲਗਾਓ।
- ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ)
- ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ

- ★ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਭੱਜਣਾ
 - ★ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ
 - ★ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ
 - ★ ਅਚਾਨਕ pH ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ## ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ
1. ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
 - ★ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ।
 2. ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 - ★ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨਲੇਟ/ਆਊਟਲੇਟ 'ਤੇ ਜਾਲ ਲਗਾਓ।

3. ਗੰਦਗੀ ਨਿਯੰਤਰਣ
- ★ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂਨਾ ਜਾਂ ਜਿਪਸਮ ਲਗਾਓ।
4. ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ★ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੋਸਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

5. ਸਟਾਕਿੰਗ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ

- ★ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚੋ; ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੰਦ ਕਰੋ।
- 6. ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ
- ★ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ-ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ।
- 7. ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
- ★ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ; ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਵਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਫਰਵਰੀ)
- ਸਰਦੀਆਂ ਕਾਰਪ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ

- ★ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
- ★ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ
- ★ ਹੌਲੀ ਵਧਾ
- ★ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰੀਕਰਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ

1. ਖੁਰਾਕ ਸਮਝੋਜਨ
- ★ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ।
- ★ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ, ਪਚਣਯੋਗ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
2. ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
- ★ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
3. ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ
- ★ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ।
4. ਖਾਦ ਘਟਾਉਣਾ
- ★ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
5. ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ★ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
6. ਕਟਾਈ
- ★ ਸਰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ।

ਪੂਰਵ-ਭੰਡਾਰ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮੀ ਏਕੀਕਰਨ

ਪੂਰਵ-ਭੰਡਾਰ ਪੜਾਅ

- ★ ਤਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ
- ★ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ
- ★ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
- ਪੂਰਵ-ਭੰਡਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

(ਬਾਕੀ ਸਫਾ 15 'ਤੇ)

ਇਥੇਨੋਲ ਅਤੇ ਈ 20 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ- 'ਪੀਲਾ ਸੋਨਾ', ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਬਦੌਲਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਰਜਾ ਨੀਤੀ ਗੇਮ-ਚੇਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪੌਲ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 52 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ 20 ਏ ਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ। ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਲਏ। ਮੱਕੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਪੀਲਾ ਸੋਨਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕਤ ਆਏ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ?" ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ : ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੀਮਤ। ਪੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰੋਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 61 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਝੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2010 ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇਹ 1,800 ਤੋਂ 1,900

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਈ 20 ਵਿੱਚ 'ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ'

ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।" ਆਪਣੀ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਕੀ ਵੇਚ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰੋਗਾ ਵਿੱਚ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦਯ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅੱਜਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ।" ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ : 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ, ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਕੋਰਨ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਪੌਪਕਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸੁਪੌਲ ਦੇ ਨਕਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 58 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਿਥਿਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੋਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।"

ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਇਥੇਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ

ਇੱਕ ਇਥੇਨੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਇਥੇਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ



ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।" ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਆਧਾਰਿਤ 12 ਇਥੇਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੱਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ : 2018 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ 3.02 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਕੁੱਲ ਮੱਕੀ

ਉਤਪਾਦਨ 4.61 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਫ਼ਤਰ (52), ਜੋ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੱਕੀ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ-ਗੁਲਾਬ ਬਾਗ ਮੰਡੀ, ਪੂਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।"

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 2,410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੋਲਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

- ਕੁਮਾਰ ਅੰਜੁਮਾਨ

ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 14 ਦੀ

ਕਾਰਪ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ

ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਕਿੰਗ ਪੜਾਅ

★ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰੋ

★ ਸਹੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਘਣਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ

★ ਪੌਲੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਸਾਰੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੜਾਅ

★ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦ
★ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

★ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਮੌਸਮੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ। ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ :

ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਰੇਂਜ

ਤਾਪਮਾਨ 25-32°C

ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਜਨ 5

ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀ.

pH 6.5-8.5

ਅਮੋਨੀਆ 0.02 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀ.

ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਾਲਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕਾਰਪ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ :

★ ਗਰਮੀਆਂ : ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੁਰਾਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੋ

★ ਮੌਨਸੂਨ : ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ

★ ਸਰਦੀਆਂ : ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਛਾਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੀਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੈਲੇਟਡ ਫੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ

ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ :

★ ਗਰਮੀਆਂ : ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

★ ਮੌਨਸੂਨ : ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਲਾਗ

★ ਸਰਦੀਆਂ : ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰਧਕ ਸ਼ਕਤੀ

ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ :

★ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ

★ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚੋ

★ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

★ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਟਿਕ ਇਲਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਪ ਫਾਰਮਿੰਗ
ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

★ ਮੱਛੀ-ਕਮ-ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ

★ ਮੱਛੀ-ਕਮ-ਬਤਖ ਪਾਲਣ

★ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪ ਪੌਲੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਪਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਟਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ :

★ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

★ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

★ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

★ ਸੁਧਰੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ

ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

★ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (4-10 ਟਨ/ਹੈਕਟੇਅਰ/ਸਾਲ ਤੱਕ)

★ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

★ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ

★ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ

ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਘੱਟ-ਉਪਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪ ਮੱਛੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ। ਹਰ ਮੌਸਮ-ਗਰਮੀਆਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪ ਕਲਚਰ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉੱਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੁਧਰੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਜਲ-ਪਾਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਥਾਨੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜੂ

★ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ★ ਖੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ★ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 320 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ



ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 400 ਟਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ



ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 46.34 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦੇ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ ਜੀ ਐਫ ਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟੇ (ਟੀ ਆਰ ਕਿਊ) ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਮ ਟੀ) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸ-ਮਿਲ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਐਕਸ ਮਿਲ ਕੀਮਤ 5,400-5,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3,900 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੁਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 52.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ

ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ

ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੇਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ

ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 42 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਵ 32 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰਨਿ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 320 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤਕਰੀਬਨ 285 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਟਨ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਸਟਾਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ 1983 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ

ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆਂ

ਸੰਪੂਰਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 52 ਅੰਕ

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ **100/-** ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚੰਦਾ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਇੱਕ ਸਾਲ **500/-** ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲ **800/-** ਰੁਪਏ

ਇੱਕ/ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ : 90410-14575, 98151-04575

KHETI DUNIYA
TID - 62763351



ਢੰਦੇ ਭਰਨ ਲਈ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜੂ ਗੰਨੇ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਰਾਟ ਅਤੇ ਟਾਪ ਬੋਰਰ ਰੋਗ

ਇਸ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਆਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰੀਬ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ।



ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜੂ ਰਨਿ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਰਾਟ ਅਤੇ ਟਾਪ ਬੋਰਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਰਨਿ ਦਾ ਭਾਰ, ਰਸ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਰਨਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜੂ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗਲੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਪਿਛਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।